


APOQUEL® MENUNJUKKAN KECEPATAN PENYEMBUHAN YANG DIMULAI DARI PENGENDALIAN GATAL DALAM 4 JAM, DIBANDINGKAN ORAL STEROID^{6,11}




DESAIN STUDI

- Percobaan pada 123 anjing dimaksudkan untuk menunjukkan efikasi dan keamanan APOQUEL untuk mengendalikan gatal dan tanda-tanda klinis yang terkait dengan dermatitis alergi pada anjing yang dimiliki klien. APOQUEL diberikan dengan dosis 0,4-0,6 mg/kg dua kali sehari (BID) hingga hari ke-14 (3 2), dilanjutkan dengan dosis 0,4-0,6 mg / kg sekali sehari (SID) hingga hari ke-28 (3 2)
- Perbandingan dengan obat kontrol positif, prednisolon, dosis 0,5-1,0 mg / kg SID hingga hari ke-6 (3 1), dilanjutkan dengan 0,5-1,0 mg / kg setiap hari (EOD)

References: 1. Edwards SH. The Merck Veterinary Manual, 11th ed. Kenilworth, NJ: Merck Sharp & Dohme Corp; 2014. <http://merckvetmanual.com/pharmacology/anti-inflammatory-agents/corticosteroids?g=anti-inflammatoryagents&all=sh>. Accessed January 4, 2018. 2. Sousa CA. Glucocorticoids in veterinary dermatology. In: Bonagura JD, Twedt DC, eds. *Kirk's Current Veterinary Therapy*, 14th ed. St. Louis, MO: Saunders Elsevier; 2009:400-404. 3. Cosgrove SB, Wren JA, Cleaver DM, et al. Efficacy and safety of oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs with canine allergic dermatitis. *Vet Dermatol*. 2015;24(5):479-484. doi:10.1111/vde.12047. 4. Data on file, Pruritus: Insight Into the Dog and Dog Owners' Journey, May 2015, Zoetis Inc. 5. Data on file, APOQUEL/CYTOPOINT Vet Tracker Wave 9, January 2018, Zoetis Inc. 6. Gadeyne C, Little P, King VL, et al. Efficacy of oclacitinib (APOQUEL®) compared with prednisolone for the control of pruritus and clinical signs associated with allergic dermatitis in client-owned dogs in Australia. *Vet Dermatol*. 2014;25(6):512-518. doi:10.1111/vde.12166. 7. Cosgrove SB, Cleaver DM, King VL, et al. Long-term compassionate use of oclacitinib in dogs with atopic and allergic skin disease: safety, efficacy and quality of life. *Vet Dermatol*. 2015;26(5):171-179. doi:10.1111/vde.12194. 8. Coutinho AE, Chapman KE. The anti-inflammatory and immunosuppressive effects of glucocorticoids: recent developments and mechanistic insights. *Mol Cell Endocrinol*. 2011;335(1-2):E. doi:10.1016/j.mce.2010.04.005. 9. Gonzales AJ, Bowman J, Fici G, et al. Oclacitinib (APOQUEL®) is a novel Janus kinase inhibitor with activity against cytokines involved in allergy. *J Vet Pharmacol Ther*. 2014;37(4):317-324. doi:10.1111/jvp.12101. 10. Aleo MM, Galvan EA, Reed JT, et al. Effects of oclacitinib and prednisolone on skin test sensitivity [abstract]. *Vet Dermatol*. 2013;24(3):297. 11. Data on file, Study Report No. AK1R-AU-12-096, Zoetis Inc. 12. Fleck TJ, Humphrey WH, Galvan EA, et al. Comparison of the onset and antipruritic activity of the JAK inhibitor oclacitinib to prednisolone and dexamethasone in an interleukin-31 canine model of pruritus [abstract]. *Vet Dermatol*. 2013;24(3):297. 13. Data on file, APQ Speed of Onset Study, Zoetis Inc.

APOQUEL® MENUNJUKKAN MULA KERJA LEBIH CEPAT YANG NYATA DIBANDING DEKSAMETASON INJEKSI^{12,13}



DESAIN STUDI

- Sebuah studi dosis tunggal pada 24 anjing beagle untuk membandingkan onset dan efikasi APOQUEL sebagai antipruritus dengan prednisolon dan deksametason pada anjing model yang gatal karena diberi IL-31. APOQUEL 0,4 mg / kg diberikan per oral dan deksametason 0,2 mg / kg diberikan secara injeksi IM.
- Perilaku gatal (seperti menjilati, menggaruk, menggelengkan kepala, dan menggosok tubuh) yang ditunjukkan oleh anjing beagle diamati dengan survey video dan diberi skor selama 2 jam setelah injeksi intravena dL-31.

apoquel

Kemasan: botol plastik berisi 100 tablet.



KEMANTAN RI
No. 1.20046381 PKM



KEMANTAN RI
No. 1.20046382 PKM



KEMANTAN RI
No. 1.20046380 PKM

apoquel
(oclacitinib tablet)

Ketika saatnya dia datang untuk penyembuhan yang cepat dari gatal alergi tanpa efek samping yang umum seperti steroid*

JANGAN BIARKAN DIA MENUNGGU



INDIKASI: Kontrol pruritus yang berhubungan dengan alergi dermatitis dan kontrol atopi dermatitis pada anjing minimal umur 12 bulan.

*Efek samping umum steroid termasuk polyuria, polydipsia dan polyphagia.¹² Efek samping APOQUEL yang paling sering dilaporkan adalah muntah, diare, dan akan sembuh dengan sendirinya.³



www.zoetis.co.id

@zoetispetz.id

zoetis

GATAL MENGGANGGU IKATAN ANTARA HEWAN DENGAN PEMILIKNYA⁴



Pemilik merasa sedih, tidak terbantu, dan frustrasi karena gatal pada anjingnya.⁴



Menggaruk dapat mengganggu tidur anjingnya dan penghuni rumah lainnya.⁴



Anjing yang mengalami gatal enggan bermain dan berinteraksi dengan keluarga pemiliknya.⁴

Sebagian besar anjing tidak diobati saat Anda melihatnya menunjukkan gatal pertama kali.⁴

- **88% pemilik hewan** telah mencoba pengobatan di rumah.⁴
- **38% pasien baru** telah diobati dengan shampoo; 16% diobati dengan antihistamin.⁴

KLIEN ANDA INGIN CEPAT SEMBUH PADA SAAT KUNJUNGAN PERTAMA

INFORMASI KEAMANAN PENTING: Jangan berikan APOQUEL pada anjing umur kurang dari 12 bulan atau yang mengalami infeksi serius. APOQUEL dapat meningkatkan perkembangan infeksi serius dan dapat menyebabkan infestasi parasit yang ada di kulit atau kanker memburuk. APOQUEL belum pernah diujikan pada anjing yang sedang dalam pengobatan kondisi kulit seperti dengan kortikosteroid dan siklosporin.

STEROID MENGURANGI GATAL, TETAPI EFEK SAMPINGNYA MEMBUAT LEBIH MENDERITA⁵

- **Hanya 11%** dokter hewan yang melaporkan puas dengan pemakaian steroid untuk mengobati gatal, dan masih meresepkannya untuk kasus akut dan gatal awal.⁵
- **7 dari 10 anjing** dengan gejala gatal pertama kali pada akhirnya akan didiagnosis dengan gatal alergi kronis.⁵

FAKTA HARGA "MURAH" STEROID

Pemilik hewan menghabiskan rata-rata **5 jam dalam seminggu** mengendalikan efek samping yang berhubungan dengan steroid.⁴

Harga belum termasuk:



Pengobatan yang berhubungan dengan efek samping⁴



Pembersihan rumah karena "tidak sengaja" urinasi⁴



Kunjungan dokter hewan untuk menindaklanjuti maupun penanganan karena efek samping⁴

Jangan diberikan pada anjing yang dikawinkan, bunting atau menyusui. Efek samping yang paling sering dijumpai adalah muntah dan diare. APOQUEL aman digunakan dengan banyak obat-obatan lain termasuk antiparasit, antibiotik, dan vaksin.

Informasi lebih detail dapat dilihat pada **Prescribing Information**.

MULAILAH DAN TETAP MENGGUNAKAN APOQUEL[®] UNTUK PENGOBATAN GATAL JANGKA PENDEK, JANGKA PANJANG MAUPUN PERTAMA KALI, SETIAP WAKTU

Cepat dan Efektif

- Mulai kerja dalam 4 jam⁶ dan mengendalikan gatal dalam 24 jam³

Aman

- Aman diberikan pada anjing umur 12 bulan ke atas
- Dapat digunakan jangka panjang untuk terapi perawatan
- Dapat digunakan dengan banyak obat-obatan lain
 - Termasuk NSAIDs, anti-infektif, antiparasit, antifungal, dan allergen-specific immunotherapy⁷
 - Penggunaan APOQUEL tidak pernah dievaluasi pada kombinasi dengan immunosuppressant sistemik seperti kortikosteroid dan siklosporin
- Tidak untuk anjing dengan infeksi serius atau untuk anjing yang dikawinkan, bunting atau menyusui.

Bukan Steroid

- 55% pemilik anjing melaporkan efek samping dari steroid.⁴ Yang paling sering adalah peningkatan rasa lapar, haus dan urinasi berlebihan
- APOQUEL memiliki cara kerja yang berbeda dengan steroid.^{8,9} Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah muntah dan diare, dan sembuh dengan sendirinya³
- Menyeimbangkan antara kebutuhan untuk sembuh dengan pertimbangan efek sampingnya menimbulkan emosional "roller coaster" bagi pemilik hewan.

Bisa Bersamaan Uji Diagnostik

- Tidak mempengaruhi hasil uji maupun diagnosa
- Kecepatan penyembuhan mengembalikan kualitas hidup⁷ ketika Anda mencari penyebab gatal



apoquel[®]
(oclacitinib tablet)